



Toestemmingsformulier Toedienen zetpil / paracetamol

1.0 Gegevens kind

Naam kind :

Geboorte datum :

Naam medicijn : Paracetamol

Voor welke aandoening : Bij koorts hoger dan 38.6 C of
bij pijn

1. Vorm toe te dienen medicijn

Zetpil

Paracetamol tablet

Sinasspil drank

Wijze van inname

Met water

Zonder water

Voor het eten

Tijdens het eten

Na het eten

Oraal

Rectaal

2. Dosering paracetamol – Sinaspril – Zetpil

Baby's van 3 – 12 maanden : een zetpil van 120 mg – 125 mg 2 – 3 maal per dag.

Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag.

Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één zetpil van 240 mg 3 maal per dag.

Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): één zetpil van 240 mg 4 maal per dag.

Tenminste 4 uur wachten tot de opeenvolgende doseringen en niet langer dan 2 dagen gebruiken!



3. Tijdstip toediening

O Indien nodig wordt ik als ouder gebeld voor het toedienen van de paracetamol.

O Wij mogen op eigen inzicht zonder ouders te contacteren u kind bij pijn of koorts een zetpil of paracetamol toedienen op de wijze zoals aangegeven in dit formulier.

Er wordt altijd in het communicatie schriftje geschreven wanneer u kind een medicijn heeft toegediend heeft gekregen uit punt 1.1.

Toedienen van zetpillen door : Alleen de gediplomeerde gastouder

Wie bewaakt inname : Gastouder

Eventuele opmerkingen

Ouders / verzorgers zijn op de hoogte van het medicijn beleid en geven door dit formulier, toestemming om de medicatie toe te dienen aan het kind opgenomen in punt 1.0.

Gegevens ouders

Naam :
Datum :
Plaats :
Handtekening :

Gegevens Gastouder

Naam : Sheila Minten
Datum :
Plaats : Weert
Handtekening :

